



**FUNCIÓN:** Repelente insecticida compuesto a base de productos orgánicos. Bioinsecticida

**FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR:** GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis Donaldo Colosio, No. 1858, Col. San Patricio, Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50.  
ventas@greencorp.mx

Composición química	% (P/V)
Terpenoides de origen vegetal (Terpenos cítricos, oleorresinas de <i>Capsicum</i> spp).	12.00%
Alcaloides de origen vegetal (Oleorresinas de <i>Capsicum</i> spp).	1.00%
Ácidos grasos y aminoácidos totales.	14.00%
Sulfonatos y compuestos azufrados (Extractos y aceites de <i>Allium</i> spp).	1.00%
Acondicionadores y diluyentes.	72.00%

**CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:** Densidad: (1.012-1.071) g/ml; pH: 4.09-5.81

**FORMULACIÓN:** Líquido.

**PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN:** Pestil Out<sup>®</sup> es un producto complejo de acción Repelente-Insecticida-acaricida de amplio espectro, el cual está formulado a base de extractos vegetales y solubles de origen marino. Pestil Out<sup>®</sup> provee a la planta de excelentes niveles de repelencia y participa, además de manera efectiva en el control de larvas de lepidópteros e insectos chupadores que atacan los cultivos. Ejerce efecto de derribe por contacto y una buena acción sistémica proporcionada por los extractos naturales por lo que se recomienda la aplicación en conjunto con un penetrante.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Siempre calibre su equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes de usarse. Aplicación foliar.



## DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN:

Cultivo	Dosis de aplicación	Frecuencia
Calabacita, melón, sandía, pepino, brócoli, coliflor, hortalizas en general, berrys, frutales y ornamentales.	1-2 L/ha para mosquita blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> ) ácaros, áfidos, psílidos, minadores, etc.	Como repelente en ausencia de la plaga aplicar a intervalos de 10 a 15 días. En presencia de la plaga a intervalos de 5 a 7 días.

Algunas plagas específicas no contempladas en la tabla anterior también pueden ser controladas, por lo que se sugiere realizar pruebas a dosis variadas.

Bajo condiciones de invernadero, para la producción de flores y hortalizas, se sugiere emplear la mitad de la dosis arriba recomendada, con aplicaciones semanales.

**Pestil Out<sup>®</sup>** puede ser aplicado solo o combinado con otros productos en aplicaciones foliares, utilizando el equipo convencional para estos propósitos; sugiriendo se emplee agua limpia. Se recomienda realizar las aplicaciones de **Pestil Out<sup>®</sup>** cuando las condiciones ambientales sean favorables (bajo viento, temperatura regular y sin lluvia), para asegurar una buena dispersión y permanencia del producto sobre las plantas y su efectividad sobre las plagas.

**Días a cosecha:** 1 día, cultivos de hojas

**Horas de reentrada al campo:** 6 hrs.

**Límite máximo de residuos:** No tiene.

**INCOMPATIBILIDAD:** **Pestil Out<sup>®</sup>** es compatible con la mayoría de los agroquímicos; sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos, no se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.

**TOXICIDAD:** **Pestil Out<sup>®</sup>** no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas en la etiqueta. El producto es considerado ligeramente tóxico. En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico.

